

" Change of paradigm during the 20th century
- From one to billions of planetary systems "

Michel Mayor
Université de Genève





An old philosophical question!

Epicurus 341 - 270 BC

Worlds are in an infinite number, some of them similar to our own one, some others being different...

...living species, plants and all the other visible things could exist in some worlds and could not in others.

But also: Leucippus -510 -420 ; Democritus -460 -350

Ponad 2400 lat temu greccy filozofowie wyrazili ideę nieskończonej liczby światów we wszechświecie. W tym samym piśmie z IV wieku p.n.e., Epikur wyraził nawet pogląd, że niektóre z tych Światów (a nie inne!) muszą być zaludnione przez żywe istoty.

Circa 1200-1280: Saint Albert the Great:

«Do there exist many worlds, or is there but a single world?
This is one of the most noble and exalted questions in the study
of Nature.»

1277 Etienne Tempier

(Bishop of Paris, with the agreement of Jean XXI)


Asked that the question of the plurality of worlds be taught at the
Sorbonne

1600+ Giordano Bruno: « De l'infinito , universo e Mundi »

1755 Emmanuel Kant: « Universal Natural History and Theory of Heaven »


1756 Pierre-Simon Laplace: « Exposé du système du monde »

Wbrew powszechnie przyjętym poglądom, idea wielości światów była w ostatnich dwóch tysiącleciach stale dyskutowana, zwłaszcza w krajach chrześcijańskich. W szczególności rozważ prośbę do papieża o nauczanie hipotezy o wielości światów na Sorbonie w XIII wieku.




Atlas Doppelmayr 1742

W ślad za ideami Giordano Bruno (koniec XVI wieku) w dziedzinie sztuki pojawiła się idea istnienia układów planetarnych związanych z licznymi gwiazdami (tu atlas Dopplmayra 1742)




- The Milky Way our Galaxy.
- 200 billions stars .How many Earth-Twins ?
- Light need 100'000 years from one side to the other.




Credit : ESA Gaia mission

**How many planetary systems
in the Milky Way?**



Estimated number of planetary systems

in the Milky Way



PROPOSAL FOR A PROJECT OF HIGH-PRECISION STELLAR
RADIAL VELOCITY WORK

By Otto Struve

"I have suggested elsewhere that the lack of rapid axial rotation of normal solar-type stars ... suggests that these stars have converted their angular momentum from axial rotation to angular momentum from the orbital motion of the planets. Therefore there can be many planet-like objects in the galaxy.
"


"Zasugerowałem w innym miejscu, że brak szybkiej rotacji osiowej normalnych gwiazd typu słonecznego ... sugeruje, że gwiazdy te przekształciły swój moment pędu z rotacji osiowej na moment pędu z ruchu orbitalnego planet. Dlatego w galaktyce może znajdować się wiele obiektów planetopodobnych. "



Galaktyka spiralna podobna do naszej: zauważ różowe mgławice wzdłuż ramion spiralnych: miejsca powstawania gwiazd ORAZ układów planetarnych.

Giant molecular clouds:

Sites for the stellar formation and planetary systems



Protoplanetary Disks Observed with the HST (1995)



**Protoplanetary Disks
Orion Nebula**

HST • WFPC2

PRC95-45b • ST ScI OPO • November 20, 1995

M. J. McCaughrean (MPIA), C. R. O'Dell (Rice University), NASA

How to detect planets around stars?






Indirect detection by measuring the Doppler Shift due to Stellar Wobble.

Proposed by:

Belorizki,D. 1938 and Struve,O. 1952

Doppler Shift due to
Stellar Wobble




Discovery of a first planet (51 Pegasi b) hosted by a star similar to our Sun (Mayor & Queloz , Nature 1995)

$$M_{\text{pl}} = 0.5 M_{\text{Jup}}$$

$$P = 4.2 \text{ days} \quad \dots \quad 1/1000 \text{ of theoretical predictions !!!!!}$$

$$a = 0.04 \text{ UA}$$



Today : more than 5000
exoplanets have been
discovered and characterized.

HD10180: A planetary system with more than 7 planets

$$P_1 = 1.18 \text{ day}$$

$$e_1 = 0$$

$$m_1 \sin i = 1.5 M_{\oplus}$$

$$P_2 = 5.76 \text{ days}$$

$$e_2 = 0.07$$

$$m_2 \sin i = 13.2 M_{\oplus}$$

$$P_3 = 16.4 \text{ days}$$

$$e_3 = 0.16$$

$$m_3 \sin i = 11.8 M_{\oplus}$$

$$P_4 = 49.7 \text{ days}$$

$$e_4 = 0.06$$

$$m_4 \sin i = 24.8 M_{\oplus}$$

$$P_5 = 122.7 \text{ days}$$

$$e_5 = 0.13$$

$$m_5 \sin i = 23.4 M_{\oplus}$$

$$P_6 = 595 \text{ days}$$

$$e_6 = 0.0$$




$$m_6 \sin i = 22 M_{\oplus}$$

$$P_7 = 2150 \text{ days}$$

$$e_7 = 0.15$$

$$m_7 \sin i = 67 M_{\oplus}$$



Lovis et al. 2010




Oto przykład układu wieloplanetarnego (7 planet), który wykryliśmy w Chile (ESO) dzięki wykryciu zmian prędkości gwiazdy.
Zmienność wywołana przez 7 planet na orbicie wokół tej gwiazdy.

(spektroskopia DOPPLER)

9 and 16th Sept 1999: A first planetary transit



Charbonneau,
Brown, Latham,
Mayor 2000, ApJ, 529




Brown, Charbonneau,
Gilliland, Noyes, Burrows
2001, ApJ, 552, 699

HOT JUPITERS are gaseous giant planets : density = 0.3 g/cm^3


Czasami planeta pozasłoneczna (lub kilka!) przechodzi między gwiazdą a naszym teleskopem i powoduje niewielki spadek jasności gwiazdy. Technika ta, znana jako tranzyty planetarne, doprowadziła do odkrycia tysięcy układów planetarnych (z ziemi lub za pomocą satelitów: CoRoT, Kepler, TESS, CHEOPS).

Obraz przedstawia pierwszy tranzyt wykryty we wrześniu 1999 roku.

The harvest from the KEPLER space mission




Four 8-meter Unit Telescopes Very Large Telescope Paranal, Chile



Precision :
10 cm/s
Towards characterization of
Earth-type planets

ESPRESSO
@Combined Coudé lab
380–780 nm
 $\lambda/\Delta\lambda=134,000$




A composite image featuring a bright, orange-yellow star in the upper left, a detailed view of Earth showing green continents and blue oceans in the lower right, and a vast, dark space filled with numerous distant stars and a faint, glowing spiral galaxy in the background.

Earth twins ?


With life ?

*Towards a new « Copernician
revolution »*

Is Life a « cosmic imperative » ?



Exoplanets atmospheres, with the ultimate goal of detecting bio-signatures




Palomar 5.08 m (1948)

Largest optical/infrared telescope in the world

- 39-m segmented primary mirror
- fully AO assisted telescope
- On Cerro Armazones, integral part of the Paranal system
- Construction started 2015, first light expected end of 2025

The European ELT




ESO ELT 39 m (2028)

E-ELT , January 2022



JWST



A small estimation !!!

An hypothetical « habitable » planet at 30 light-years is one billions times the distance to the moon !

A travel of several millions of years at Apollo 11 velocity .

The quantity of energy needed to significantly accelerate then decelerate the space mission (at a velocity close to the velocity of light) is **impossible**.

>>>>>>>>> If the Earth begins to be inhabitable the humanity will NOT have any possibility to emigrate on another exoplanet .

Despite of the huge number of exoplanets in the galaxy
We do not have a « Plan B ».

Małe szacunki !!!

Hipotetyczna " nadająca się do zamieszkania " planeta w odległości 30 lat świetlnych to jeden miliard razy większa odległość od Księżyca !

Podróż trwająca kilka milionów lat z prędkością Apollo 11 .

Ilość energii potrzebna do znacznego przyspieszenia następnie wyhamowania misji kosmicznej (z prędkością zbliżoną do prędkości światła) jest niemożliwa.

>>>>>>>>> Jeśli Ziemia zacznie nadawać się do zamieszkania ludzkość nie będzie miała możliwości emigracji na inną egzoplanetę.

Pomimo ogromnej liczby egzoplanet w galaktyce

Nie mamy "planu B".

Thank you

